

Hinweis bei Einnahme von Blutgerinnungshemmenden Medikamenten

Es ist bekannt, dass bestimmte Medikamente die Blutgerinnung beeinflussen, und so zu blutungsbedingten Komplikationen führen können.

Sollten Sie daher z.B. Acetylsäurehaltige Präparate (z.B. Aspirin, ASS, Asasantin, Godamet, Vivimed, etc.) einnehmen, so bitten wir Sie diese Medikamente, nach Rücksprache mit dem verordnendem Hausarzt, 5-8 Tage vor dem geplanten Eingriff abzusetzen.

Gleiches gilt auch für die Thrombozytenaggregationshemmer wie z.B. Ticlopidin (Desitic, Iopidin, Tiklyd, Clopidogrel, Iscover, Plavix, etc.)

Bei Marcumar Tabletteneinnahme bitten wir Sie dieses Präparat ca. 8 Tage vor dem geplanten Eingriff abzusetzen und dafür eine Injektionsbehandlung mit einem niedermolekularen Heparinpräparat (bitte Hausarzt befragen) vorzunehmen. Der IRN Wert (Normalwert = 1, Therapeutisch meist zwischen 2 – 4) sollte ca. 1.5, der Quick Wert ca. 25% betragen.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

Ihr Praxisteam