


Funktionskieferorthopädische Geräte

Liebe Patientin, lieber Patient !

Heute wurde Dir eine neue Spange eingesetzt, mit der Deine Zahnstellung reguliert werden soll. Der Erfolg der Behandlung hängt davon ab, wie gut Du dieses Gerät trägst. Wir erwarten von Dir also eine regelmäßige und intensive Mitarbeit und möchten Dir daher erklären, wie eine solche Spange wirkt und welche Regeln beachtet werden müssen. Bedenke bitte, daß die eingesetzte Spange zur Regulierung nur so lange erfolgreich verwendet werden kann, wie Du noch wächst. Wird die Möglichkeit, das Kieferwachstum zu fördern, durch unzureichendes Tragen der Spange vertan, ist die kieferorthopädische Behandlung später viel aufwendiger, risikoreicher und weniger erfolgreich. Nicht selten ist später eine Regulierung nur durchführbar, wenn mehrere bleibende Zähne gezogen werden und in ungünstigen Fällen werden sogar chirurgische Maßnahmen notwendig. Also nutze Deine Chance jetzt !



Informationen für die ersten Tage :

Im Gegensatz zu anderen (vor allem festsitzenden) Apparaturen sitzt Deine Spange **lose** im Mund, klammert sich also nicht an den Zähnen fest. Es kann daher sein, daß sie in den ersten Nächten manchmal herausfällt ("verloren wird"). Nach einer kurzen Zeit der Eingewöhnung wird sich das rasch geben. Du gewöhnst Dich an die neue Spange besonders gut, wenn Du sie auch am Tage recht viel trägst.

Gib uns sofort Bescheid, wenn

- die Spange drückt, scheuert, schlecht paßt oder defekt ist
- Drähte zu stark angespannt sind
- durchbrechende Zähne, lockere Milchzähne oder andere Umstände Dich daran hindern, die Spange beschwerdefrei zu tragen. Wir helfen Dir dann.

Sprich bitte auch mit Deinem Behandler, wenn Du Schwierigkeiten haben solltest, durch die Nase zu atmen.

Wann soll die Spange getragen werden ?

Je öfter Du Deine Spange einsetzt, um so besser und schneller läßt sich Dein Gebiß regulieren.

Um richtig wirken zu können,

muß die Spange nachts und mindestens Stunden am Tage im Munde sein!

Beim Essen und beim Sport soll sie nicht eingesetzt werden; gegen das Tragen in der Schule ist aber nichts einzuwenden.

Funktionskieferorthopädische Apparate sind eine Art "Turngerät", mit welchem Deine Kaumuskel gestärkt und Störungen der Muskelfunktion normalisiert werden sollen.

Da Du Deine Muskeln aber in der Nacht selten benutzt, ist es besonders wichtig, die Spange auch am Tage zu tragen. Aus den gleichen Gründen sollst Du sie beim Sprechen nicht herausnehmen, auch wenn die Aussprache in der Eingewöhnungsphase etwas schwieriger ist und Du manchmal nicht so gut verstanden wirst.

Wo soll die Spange aufbewahrt werden, wenn sie nicht im Munde ist ?

Wenn Du Deine Spange nicht trägst, sollst Du sie **stoßgeschützt in einer Spangendose** aufbewahren. Sie gehört weder lose in die Hosentasche oder in den Ranzen noch unter die Schulbank, auch soll sie zu Hause nicht lose herumliegen. Beim Essen im Restaurant darfst Du die Spange nicht in eine Serviette wickeln (und dann vergessen), sie gehört auch nicht lose ins Urlaubsgepäck.

Schreibe Namen und Adresse in die Dose hinein, damit Du sie zurückerhältst, wenn sie einmal verloren geht.

Wie bleibt Deine Spange appetitlich und sauber ?

Reinige Deine Spange jeden Tag mit Zahnbürste und Zahnpasta oder zusätzlich mit Reinigungstabletten.

Bitte koche die Spange niemals aus, weil sich der Kunststoff dabei verformt !

Wann muß Dein Behandler nach der Spange schauen ?

Soll Deine Regulierung erfolgreich und ohne Probleme verlaufen, muß die Spange regelmäßig kontrolliert und nachgestellt werden. Die vereinbarten Termine solltest Du pünktlich einhalten (und Deine Spange muß Du natürlich jedesmal zur Kontrolle mitbringen).

Bei auftretenden Schmerzen, Verlust oder Beschädigung der Apparatur oder wenn die Spange nicht richtig paßt, solltest Du - abweichend vom ursprünglich abgesprochenen Termin - möglichst rasch in die Praxis kommen.

In solchen Notfällen bekommst Du immer kurzfristig einen Termin.

Auf keinen Fall solltest Du im Tragen der Spange längere Zeit aussetzen - aus welchem Grund auch immer (Schmerzen, Krankheit, Ferien, Schullandheim usw.)

Wird die Spange nicht regelmäßig getragen und läßt Du sie nur ein paar Tage aus, rutschen Zähne und Kiefer sehr rasch wieder in die alte Stellung zurück und Dein monatelanges, fleißiges Tragen war umsonst. Deine Behandlung dauert dadurch nicht nur wesentlich länger, es ist auch schwieriger, ein gutes Ergebnis zu erreichen.

Wäre das nicht schade